

Liebst Du mich nicht?

...ich habe keine Kondome

Verdammt, was kümmert's uns, lass es uns einfach tun

Komm schon, Wasser reinigt die Nadel auch

Ich kann nicht auf eine saubere Nadel warten

Komm, verzichten wir auf Gummis, nur dieses eine Mal...

**Wenn Du ungeschützten Sex hast oder Nadeln austauschst, kannst Du das Risiko Dich mit AIDS zu infizieren erhöhen.
Kontrolliere Dein Leben ... nimm keine Drogen!**

Es ist OK, wenn nur Du und ich diese Nadel benutzen

Ich hab' nur eins genommen

Es ist OK, ich nehm'eh die Pille

Nur dieses eine Mal, nächstes Mal nehme ich ein Kondom

Hat irgend jemand eine Nadel?

Vertrau mir, ich weiss, dass ich clean bin



UNITED NATIONS
Office on Drugs and Crime

Für weitere Informationen:

www.unodc.org

www.unaids.org

www.aegis.org

www.thebody.com

Was ist AIDS?

AIDS ist eine unheilbare Krankheit, die durch HIV verursacht wird. Wenn HIV in Deinen Körper eindringt, greift es Dein Immunsystem an, das Deinen Körper vor Erkrankungen schützt. Da nach einiger Zeit Dein Immunsystem abschwächt, bekommst Du leichte Krankheiten, dann schwere und schließlich lebensbedrohliche wie Tuberkulose und Lungenentzündung. Diese Endphase der Infektion nennt man AIDS.

Wie weiß man, ob man HIV oder AIDS hat?

Der einzige Weg um sicher zu sein, ob Du Dich infiziert hast oder nicht, ist einen Test zu machen.

Wie bekommt man HIV?

HIV verbreitet sich durch ungeschützten Sex (Sex ohne Kondom), infizierte Bluttransfusionen und verseuchte Spritzen (meist zur Injektion von Drogen verwendet). Es kann von einer infizierten Mutter während der Schwangerschaft, Geburt oder beim Stillen an ihr Kind übertragen werden.

Bekommt man HIV, wenn man Drogen nimmt?

Das Risiko, Dich mit HIV zu infizieren, ist größer, wenn Du Drogen nimmst. Denk darüber nach: Drogen verändern Deinen Verstand und beeinflussen Deine Urteilsfähigkeit, machen es schwerer, richtige Entscheidungen zu treffen und es wird wahrscheinlicher, dass Du vergisst, ein Kondom zu benutzen.

Was kann man machen, wenn man HIV hat?

Sprich mit Ärzten und Sozialberatern über medizinische Versorgung und andere Hilfe in Deiner Gemeinde. Selbst wenn teure neue Therapien, die den Ausbruch von AIDS hinauszögern nicht verfügbar sind, solltest Du Medikamente erhalten können, um Deine Infektionen zu behandeln und zu mildern, sowie psychologische Beratung und soziale Unterstützung.

Wie sieht ein HIV-Infizierter aus?

Personen mit HIV können für längere Zeit gesund aussehen und fühlen sich auch gesund, können aber auch das Virus für Monate oder Jahre in sich tragen, bevor sie krank werden. In dieser ganzen Zeit können sie unbewusst andere infizieren, falls sie ungeschützten Sex haben oder Spritzen mit anderen teilen.

Wie verhindert man, dass man sich mit HIV infiziert?

Schütz Dich mit einem Kondom, teile keine Spritzen mit anderen, und halte Dein Leben unter Kontrolle – nimm keine Drogen!

Können sich nur Homosexuelle und Drogenkonsumenten, die sich injizieren, mit HIV infizieren?

Nein. Jeder kann sich mit HIV infizieren. Bei jedem, der ungeschützten Sex hat oder Spritzen mit anderen teilt, steigt die Gefahr, sich mit HIV zu infizieren.

Eine verseuchte Nadel trägt ein größeres Infektionsrisiko als ungeschützter Sex.